

FACTEURS DE RISQUE CV¹

REPÉRER

- Antécédents familiaux de dyslipidémie
- Antécédents familiaux d'événements cardiovasculaires précoces (père < 55 ans et mère < 65 ans)
- Diabète (type 1, type 2, grossesse)
- Preuve clinique d'athérosclérose (AVC, infarctus, angine, maladie vasculaire périphérique, dysfonction érectile, etc.)
- Ménopause précoce (avant 40 ans)
- Hypertension artérielle
- Hypertension de grossesse
- Insuffisance rénale chronique (DFGe < 60 ml/min/1,73m² ou RAC > 3 mg/mmol, depuis > 3 mois)
- Maladies inflammatoires chroniques (intestinales, rhumatismales, cutanées)
- MPOC
- Obésité abdominale (tour de taille - F : 80[†] cm à > 88[‡] cm et H : 94[†] cm à > 102[‡] cm, IMC ≥ 30 kg/m²)²
- Signes cliniques de dyslipidémie
- Tabagisme*

[†] risque accru.

[‡] risque élevé.


* Aussi, consommation de drogues douces (p. ex. cannabis) et dures (p. ex. cocaïne).

1 Tirée de la SCC, 2016.

2 Tirée de la [Chaire de recherche sur l'obésité](#) de l'Université Laval.

 Retour à **Clientèle cible**

 Retour aux **Analyses de laboratoire à l'évaluation**

 Retour à l'algorithme