

Information destinée aux patients
Pénurie d'hydroxychloroquine (Plaquenil^{MC} et versions génériques)
et de chloroquine (Aralen^{MC} et versions génériques)

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d'hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d'augmenter. Une rupture d'approvisionnement de ces médicaments est anticipée.

Les stocks d'hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies **sont temporairement destinés aux patients atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS** destinés au traitement des patients du Québec atteints de la COVID-19.

L'interruption temporaire de votre médicament n'aura pas d'effet significatif sur votre état de santé.

Que devez-vous faire?

1. S'il vous reste des comprimés d'hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits
2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d'un avis contraire
3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin

Votre traitement sera repris dès que possible

Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux
Québec 

27 mars 2020



Information destinée aux patients
Pénurie d'hydroxychloroquine (Plaquenil^{MC} et versions génériques)
et de chloroquine (Aralen^{MC} et versions génériques)

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d'hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d'augmenter. Une rupture d'approvisionnement de ces médicaments est anticipée.

Les stocks d'hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies **sont temporairement destinés aux patients atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS** destinés au traitement des patients du Québec atteints de la COVID-19.

L'interruption temporaire de votre médicament n'aura pas d'effet significatif sur votre état de santé.

Que devez-vous faire?

1. S'il vous reste des comprimés d'hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits
2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d'un avis contraire
3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin

Votre traitement sera repris dès que possible

Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux
Québec 

27 mars 2020



Information destinée aux patients
Pénurie d'hydroxychloroquine (Plaquenil^{MC} et versions génériques)
et de chloroquine (Aralen^{MC} et versions génériques)

En raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale d'hydroxychloroquine et de chloroquine ne cesse d'augmenter. Une rupture d'approvisionnement de ces médicaments est anticipée.

Les stocks d'hydroxychloroquine et de chloroquine actuellement dans les pharmacies **sont temporairement destinés aux patients atteints de lupus érythémateux disséminé, aux femmes enceintes et aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Ces stocks NE sont PAS** destinés au traitement des patients du Québec atteints de la COVID-19.

L'interruption temporaire de votre médicament n'aura pas d'effet significatif sur votre état de santé.

Que devez-vous faire?

1. S'il vous reste des comprimés d'hydroxychloroquine ou de chloroquine à la maison, prenez-les tels que prescrits
2. Poursuivez tous vos autres médicaments, à moins d'un avis contraire
3. Si votre état se détériore, contactez votre médecin

Votre traitement sera repris dès que possible

Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux
Québec 

27 mars 2020