

Bulletin INESSS Express

20 octobre 2026

NOUVELLE
PUBLICATION
INSTITUTIONNELLE



Rapport annuel
d'activités
scientifiques
2025-2026

Guider | Outiller | Mobiliser

Publication du rapport d'activités scientifiques 2025-2026

L'INESSS est fier de dévoiler son [rapport d'activités scientifiques 2025-2026](#).

Ce rapport met en lumière l'étendue des travaux réalisés au cours de la dernière année afin de soutenir l'amélioration continue des soins et des services de santé. Recommandations, avis au ministre, guides d'usage optimal, évaluations, états de situation, veilles stratégiques, outils cliniques et documents méthodologiques témoignent du rôle clé de l'INESSS dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Le rapport présente également l'ensemble des publications scientifiques produites pendant l'exercice et reflète l'expertise, la rigueur et l'engagement des équipes de l'Institut.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ces réalisations ainsi qu'à nos nombreuses collaboratrices et nombreux collaborateurs pour leur précieuse contribution à notre mission.

Nouvelles
publications



Pertinence de la chimiothérapie intrapéritonéale pour prévenir ou traiter les néoplasies des surfaces péritonéales secondaires à un cancer de l'estomac et pour traiter le pseudomyxome

Les néoplasies des surfaces péritonéales (NSP) regroupent un ensemble hétérogène de cancers qui se présentent le plus souvent sous la forme de métastases péritonéales secondaires à d'autres tumeurs. Les tumeurs péritonéales sont généralement associées à un pronostic défavorable, notamment en raison de

la difficulté d'atteindre des concentrations cytotoxiques efficaces dans la cavité péritonéale avec une chimiothérapie systémique.

La chimiothérapie intrapéritonéale (CIP) est une approche thérapeutique permettant de livrer les agents cytotoxiques directement dans la cavité abdominale afin de maximiser leur concentration locale et favoriser la pénétration tissulaire tout en limitant la toxicité systémique. Cette méthode locorégionale a été employée, après une chirurgie de cytoréduction, pour traiter divers types de NSP, notamment pour les métastases péritonéales secondaires à un cancer de l'estomac ou pour traiter le pseudomyxome. L'emploi préventif de la chimiothérapie intrapéritonéale a également fait l'objet de certaines études chez les personnes à haut risque de développer des métastases péritonéales à la suite de l'exérèse chirurgicale de leur tumeur primaire.

La Direction de la cancérologie du MSSS a confié à l'INESSS le mandat d'évaluer la pertinence clinique de la [chimiothérapie intrapéritonéale](#) pour la prévention ou le traitement des NSP et de formuler des recommandations, le cas échéant, afin de soutenir une utilisation. Des recommandations pour prévenir ou traiter les néoplasies des surfaces péritonéales secondaires à un cancer de l'ovaire et à un cancer colorectal et pour traiter le mésothéliome sont aussi disponibles.

Avis de modification - Moxifloxacine en cas de morsure

L'option alternative à l'amoxicilline-clavulanate associant la moxifloxacine au TMP-SMX ou à la doxycycline, pour les personnes présentant une allergie sévère aux *pénicillines*, a été retirée de l'outil sur la [cellulite infectieuse](#) et celui sur les [plaies traumatiques](#). Cette combinaison en cas de morsure a été écartée en raison de sa couverture généralement plus large que nécessaire (sauf pour des situations exceptionnelles jugées au cas par cas par un spécialiste), de son profil d'effets indésirables et sachant que d'autres antibiotiques offrant une couverture contre les bactéries anaérobies sont disponibles dans ce contexte.

L'INESSS a pour mission de promouvoir
l'excellence clinique et l'utilisation efficace des
ressources dans le secteur de la santé et des
services sociaux.

