



FICHES RÉGIONALES

SEPTEMBRE 2026

ÉTAT DES PRATIQUES


Cancer du poumon : Portrait de l'évaluation initiale avant la chirurgie 2022-2023

Cancer du poumon : Portrait de l'évaluation initiale avant la chirurgie 2022-2023

Sur la carte, cliquer sur le numéro d'une région
socio-sanitaire pour accéder à sa fiche régionale.



- | | |
|----------|-------------------------------|
| 01 | Bas-Saint-Laurent |
| 02 | Saguenay-Lac-Saint-Jean |
| 03 | Capitale-Nationale |
| 04 | Mauricie et Centre-du-Québec |
| 05 | Estrie |
| 06 | Montréal |
| 07 | Outaouais |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue |
| 09 | Côte-Nord |
| 10-17/18 | Régions du Nord-du-Québec |
| 11 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
| 12 | Chaudière-Appalaches |
| 13 | Laval |
| 14 | Lanaudière |
| 15 | Laurentides |
| 16 | Montérégie |



BAS-SAINT-LAURENT (01)

Statistiques basées sur 103 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- HR Rimouski
- IUCPQ-UL
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- IUCPQ-UL
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 5

Forte augmentation par rapport à 2016-2019 du recours à une méthode non chirurgicale comme première approche d'évaluation efficace du médiastin.

Indicateur 6

Nombre médian de services par personne parmi les plus élevés.

Indicateurs 7 et 8

Proportion de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie parmi les plus élevés.

Indicateur 9

Proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule parmi les plus élevés.

Indicateurs 10 et 11

Proportion de recours à une évaluation efficace du médiastin et à une imagerie cérébrale parmi les plus élevés.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre. Plus élevé
	Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).	RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	132	+ 5	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	221	+ 16	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	98	+ 1,2	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	98	- 0,2	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 34	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	10	+ 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	81	+ 24	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	68	+ 4,5	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	71	- 6,2	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	50	+ 10	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	90	+ 3,4	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Bas-Saint-Laurent

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %

Statistiques basées sur 222 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- Hôp. Chicoutimi
- Hôp. Alma
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- Hôp. Chicoutimi
- IUCPQ-UL



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

✓ Indicateur 2

Délai au 90^e percentile entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie le plus court.

✓ Indicateur 5

Plus forte augmentation par rapport à 2016-2019 du recours à une méthode non chirurgicale comme première approche d'évaluation efficace du médiastin.

? Indicateur 9

Proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule parmi les plus élevées.

○ Indicateur 10

Plus faible proportion de recours à une évaluation efficace du médiastin; diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes.

? Indicateur 11

Proportion de recours à une imagerie cérébrale parmi les plus élevées.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			
		Brute	Δ		Qc
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	119	+ 11	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	173	+ 1	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	97	+ 0,9	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	93	- 4,0	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 53	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	- 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	16	- 1,6	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	14	- 5,1	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	63	- 22	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	22	- 21	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	68	- 4,2	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ○ Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Saguenay-Lac-Saint-Jean

● Autres régions

► Dépasse 100 %

CAPITALE-NATIONALE (03)

Statistiques basées sur 278 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- IUCPQ-UL
- Hôp. Enfant-Jésus
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- IUCPQ-UL
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

✓ Indicateur 1

Délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie le plus court.

🔍 Indicateur 6

Nombre médian de services par personne parmi les plus élevés.

🔍 Indicateurs 7 et 8

Proportion de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie parmi les plus élevées.

✓ Indicateur 9

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			Qc
		Brute	Δ		
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	98	- 1	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	193	+ 18	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	97	+ 2,7	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	96	+ 2,9	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 10	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	8	0	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	67	+ 28	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	42	- 12	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	9,4	- 37	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	42	+ 4,3	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	44	+ 3,4	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif 🔍 Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Capitale-Nationale

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %

Statistiques basées sur 310 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- CHAUR Trois-Rivières
- Hôp. Sainte-Croix
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- CHAUR Trois-Rivières
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 1

Délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie parmi les plus longs; augmentation la plus forte par rapport à 2016-2019.

Indicateur 2

Délai au 90^e percentile entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie le plus long; augmentation par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes.

Indicateur 5

Forte augmentation par rapport à 2016-2019 du recours à une méthode non chirurgicale comme première approche d'évaluation efficace du médiastin.

Indicateur 7

Proportion de répétition de la TDM thoracique parmi les plus élevées.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.
		RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	144	+ 47	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	238	+ 61	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	97	+ 1,1	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	92	- 3,7	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	99	+ 37	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	7	+ 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	49	+ 0,7	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	29	- 3,4	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	17	- 8,7	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	34	+ 2,8	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	53	- 4,0	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Mauricie-Centre-du-Québec

● Autres régions

► Dépasse 100 %

ESTRIE (05)

Statistiques basées sur 193 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)


- Hôp. Fleurimont
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- Hôp. Fleurimont
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique sous la cible; diminution par rapport à 2016-2019.

Indicateur 11

Proportion de recours à une imagerie cérébrale parmi les plus faibles.

Indicateur 9

Proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule parmi les plus faibles.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre. Plus élevé
	Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).	RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1. Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	119	- 4	129	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Estrie
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %


MONTRÉAL (06)

Statistiques basées sur 627 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie



Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



Hôpitaux

Chirurgie (%)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique légèrement sous la cible.

Indicateur 6

Nombre médian de services par personne parmi les plus faibles.

Indicateur 4

Proportion de recours à la TEP-TDM sous la cible; diminution par rapport à 2016-2019.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			
		Brute	Δ		Qc
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	138	+ 9	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	213	+ 9	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	89	- 0,2	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	85	- 5,3	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 1,3	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	5	- 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	30	+ 4,2	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	24	- 2,7	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	15	- 17	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	27	- 3,2	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	47	- 8,9	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Montréal

● Autres régions

► Dépasse 100 %

OUTAOUAIS (07)

Statistiques basées sur 145 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- Hôp. Hull
- Hôp. Gatineau
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- Hôp. général Montréal
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique légèrement sous la cible; légère augmentation par rapport à 2016-2019.

Indicateur 10

Augmentation par rapport à 2016-2019 la plus forte de la proportion de recours à une évaluation du médiastin.

Indicateur 6

Nombre médian de services par personne parmi les plus faibles.

Indicateur 11

Proportion la plus faible de recours à une imagerie cérébrale.

Indicateur 7

Proportion de répétition de la TDM thoracique la plus faible.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			Qc
		Brute	Δ		
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	133	+ 1	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	223	+ 5	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	88	+ 1,2	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	94	+ 3,8	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 1,8	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	5	0	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	13	- 2,0	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	18	+ 0,8	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	32	- 20	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	34	+ 15	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	33	+ 3,7	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Outaouais
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08)

Statistiques basées sur 85 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- Hôp. et CLSC Val-d'Or
- Hôp. Rouyn-Noranda
- Hôp. Amos
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- Hôp. Amos
- CHUM
- IUCPQ-UL



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 2
Forte augmentation par rapport à 2016-2019 du délai au 90^e percentile entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie.

Indicateur 4
Forte augmentation de la proportion d'utilisation de la TEP-TDM par rapport à 2016-2019.

Indicateur 5
Forte augmentation par rapport à 2016-2019 du recours à une méthode non chirurgicale

comme première approche d'évaluation efficace du médiastin.

Indicateur 8
Augmentation par rapport à 2016-2019 la plus forte de la proportion de répétition de la bronchoscopie.

Indicateur 11
Proportion de recours à une imagerie cérébrale parmi les plus élevées; augmentation par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.
		RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	130	+ 10	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	217	+ 37	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	96	- 0,7	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	95	+ 21	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 39	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	7	+ 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	32	- 5,9	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	30	+ 9,7	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	15	- 4,1	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	41	- 6,3	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	76	+ 8,5	52	

Abbréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Abitibi-Témiscamingue

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %

Statistiques basées sur 65 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)


- IUCPQ-UL
- Hôp. et CH Sept-Îles
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- IUCPQ-UL
- Hôp. Chicoutimi
- Hôp. et CH Sept-Îles
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 1

Délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie parmi les plus courts.

Indicateur 4

Augmentation de la proportion d'utilisation de la TEP-TDM par rapport à 2016-2019.

Indicateurs 7 et 8

Proportion de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie parmi les plus élevées.

Indicateur 10

Proportion de recours à une évaluation efficace du médiastin parmi les plus élevées.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			
		Brute	Δ		Qc
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	107	+ 15	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	197	+ 28	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	95	- 1,4	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	95	+ 7,3	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 7,1	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	7	- 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	50	+ 11	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	46	- 8,4	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	35	- 9,9	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	48	+ 3,2	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	43	- 11	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Côte-Nord
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %

Statistiques basées sur 67 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- IUCPQ-UL
- HR Rimouski
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- IUCPQ-UL
- HR Rimouski



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 1

Délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie le plus long; forte augmentation par rapport à 2016-2019.

Indicateur 5

Forte augmentation par rapport à 2016-2019 du recours à une méthode non chirurgicale comme première approche d'évaluation efficace du médiastin.

Indicateur 6

Nombre médian de services par personne parmi les plus élevés.

Indicateurs 7 et 8

Proportions les plus élevées de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie.

Indicateurs 9 et 11

Proportions les plus élevées de recours à la bronchoscopie seule et à une imagerie cérébrale.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			Qc
		Brute	Δ		
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	147	+ 23	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	227	+ 21	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	100	+ 3,4	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	100	+ 1,7	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	93	+ 25	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	10	+ 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	91	+ 33	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	69	+ 7,2	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	82	+ 7,9	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	40	+ 2,7	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	93	+ 8,3	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %

CHAUDIÈRE-APPALACHES (12)

Statistiques basées sur 224 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)

- Hôtel-Dieu Lévis
- IUCPQ-UL
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- Hôtel-Dieu Lévis
- IUCPQ-UL
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 1

Forte augmentation du délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie.

Indicateur 11

Proportion de recours à une imagerie cérébrale parmi les plus faibles.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			Qc
		Brute	Δ		
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	120	+ 26	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	192	+ 8	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	94	+ 2,5	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	90	- 3,3	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation effractive du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 9,8	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6,5	+ 0,5	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	32	+ 4,7	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	31	+ 4,1	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	39	- 17	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation effractive du médiastin (%)	39	- 1,0	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	39	+ 6,3	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

☒ Point positif ☐ Point de réflexion ☐ Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Chaudière-Appalaches

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %


LAVAL (13)

Statistiques basées sur 202 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie



Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



Hôpitaux

Chirurgie (%)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique légèrement sous la cible (avant l'arrondissement); diminution par rapport à 2016-2019.

Indicateur 9

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule.

Indicateur 11

Proportion de recours à une imagerie cérébrale parmi les plus élevées.

	Indicateur	Valeur		Positionnement régional	
		RSS			Qc
		Brute	Δ		
Δ : Différence absolue entre la valeur de la période 2022-2023 et celle de 2016-2019 (en points de pourcentage ou en jours, selon l'indicateur).					
Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.					
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	125	- 7	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	194	- 11	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	90	- 3,8	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	90	- 3,1	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	0	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	0	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	22	- 2,1	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	24	- 9,5	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	17	- 27	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	32	+ 0,2	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	66	- 13	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Laval

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %


LANAUDIÈRE (14)

Statistiques basées sur 266 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie



Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



Hôpitaux

Chirurgie (%)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique légèrement sous la cible; diminution par rapport à 2016-2019.

Indicateurs 7 et 8

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes des proportions de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie.

Indicateur 9

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule.

Indicateur 11

Augmentation par rapport à 2016-2019 la plus forte de la proportion de recours à une imagerie cérébrale.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre. Plus élevé
		RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	129	+ 1	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	209	+ 6	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	89	- 5,1	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	90	+ 0,1	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	99	+ 9,0	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	0	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	14	- 24	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	17	- 13	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	18	- 30	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	35	- 5,7	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	52	+ 13	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Lanaudière
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %

LAURENTIDES (15)

Statistiques basées sur 443 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)



- HR Saint-Jérôme
- Hôp. Saint-Eustache
- Hôp. Cité-de-la-Santé
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- HR Saint-Jérôme
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 2

Délai au 90^e percentile entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie parmi les plus courts.

Indicateur 11

Plus forte diminution par rapport à 2016-2019 de la proportion de recours à une imagerie cérébrale.

Indicateur 9

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion d'utilisation de la bronchoscopie seule.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.
		RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	119	- 5	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	180	- 9	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	94	+ 0,2	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	91	- 3,1	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	95	- 4,3	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	- 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	33	- 5,8	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	15	- 2,7	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	28	- 29	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	34	+ 2,2	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	54	- 20	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ⚠ Point de réflexion ○ Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Laurentides
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %

MONTÉRÉGIE (16)

Statistiques basées sur 668 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)


- Hôp. Charles Lemoyne
- CHUM
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



Hôpitaux

Chirurgie (%)

- CHUM
- Hôp. Charles Lemoyne
- Hôp. général Montréal
- Autres (Hôp. < 10 % chacun)



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

? Indicateur 3

Proportion d'utilisation de la TDM thoracique légèrement sous la cible (avant arrondissement); diminution par rapport à 2016-2019.

? Indicateur 4

Proportion de recours à la TEP-TDM légèrement sous la cible; légère diminution par rapport à 2016-2019.

	Indicateur	Valeur			Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.
		RSS		Qc	
		Brute	Δ		
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	141	+ 7	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	229	+ 14	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	90	- 1,2	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	89	- 0,9	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 2,2	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	0	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	21	- 5,2	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	32	+ 6,0	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	15	- 17	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	34	+ 5,1	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	48	- 6,2	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

Ligne bleue centrale : Québec

● Montérégie
● Autres régions
▶ Dépasse 100 %

Statistiques basées sur 15 personnes

dont le premier traitement a été la chirurgie

Hôpitaux

Services évaluation initiale (%)

● Hôp. Royal Victoria

● CS


● Hôp. Chicoutimi

● Chibougamau

● Hôp. et CLSC Val-d'Or

● Autres

(Hôp. < 10 % chacun)




Hôpitaux

Chirurgie (%)

● Hôp. Chicoutimi

● Hôp. Amos

● Hôp. général Montréal



PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS

Indicateur 1

Augmentation par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes du délai médian entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie.

Indicateur 2

Délai au 90^e percentile entre la 1^{re} évidence du cancer et la chirurgie parmi les plus longs; augmentation par rapport à 2016-2019 la plus forte.

Indicateur 4

Augmentation de la proportion d'utilisation de la TEP-TDM par rapport à 2016-2019.

Indicateurs 7 et 8

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion de répétition de la TDM thoracique et de la bronchoscopie.

Indicateur 9

Diminution par rapport à 2016-2019 parmi les plus fortes de la proportion de recours à la bronchoscopie seule.

	Indicateur	Valeur		Qc	Positionnement régional Le positionnement régional est présenté afin de faciliter la comparaison entre les régions, sans pour autant être interprété comme une cible à atteindre.
		RSS			
		Brute	Δ		
Plus élevé					
Faible = favorable	1.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - Médiane	134	+ 39	129	
	2.Délai entre la 1 ^{re} évidence de cancer et la chirurgie (jours) - 90 ^e percentile	231	+ 88	210	
Élevé = favorable	3.Proportion des personnes avec ≥ 1 TDM thoracique (%)	93	+ 3,3	92	
	4.Proportion des personnes avec ≥ 1 TEP-TDM (%)	100	+ 13	91	
	5.Proportion des personnes dont la 1 ^{re} évaluation efficace du médiastin est non chirurgicale (%)	100	+ 13	99	
Élevé = réflexion	6.Nombre de services par personne - Médiane	6	- 1	6	
	7.Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée (%)	21	- 19	33	
	8.Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée (%)	14	- 22	29	
	9.Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule (%)	20	- 37	24	
Écart élevé vs Qc = réflexion	10. Proportion des personnes qui ont eu une évaluation efficace du médiastin (%)	27	- 23	34	
	11. Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale (%)	47	- 17	52	

Abréviations : TEP : Tomographie par émission de positrons; TDM : Tomodensitométrie; RSS : Région sociosanitaire; Qc : Ensemble du Québec.

Pour le positionnement régional, les données sont exprimées en différences relatives par rapport à la valeur du Québec et sont présentées dans un intervalle de -100 % à 100 %.

✓ Point positif ? Point de réflexion ● Point neutre

* L'effectif des régions du nord du Québec (10/17/18) est faible; les résultats doivent être interprétés avec prudence, car les marges d'erreurs sont importantes.

Ligne bleue centrale : Québec

● Régions du Nord-du-Québec

● Autres régions

▶ Dépasse 100 %