

Ces recommandations sont tirées du [Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques](#).



## INDICATION

Le DMSO vous a été prescrit pour diminuer les dommages possibles qui pourraient avoir été causés par la chimiothérapie qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau.

### Mode d'emploi

4 fois par jour pour \_\_\_\_ jours

Après avoir appliqué votre compresse sèche froide :

1. Assécher bien votre peau en épongeant délicatement. Ne mettez pas de DMSO sur une peau humide parce que le DMSO et l'eau peuvent causer une brûlure chimique (formation de cloques).
2. Attention, peut être irritant pour la peau saine. Au besoin, porter des gants pour manipuler le DMSO.
3. Appliquer \_\_\_\_ gouttes de DMSO.
4. Étendre le DMSO à l'aide d'un applicateur à bout de coton et tige de bois (coton-tige).
5. Couvrir le double de la surface atteinte.
6. Laisser sécher à l'air libre (ne pas couvrir d'un pansement).

### Entreposage

- Garder hors de la portée des enfants.
- Conserver dans son contenant de verre ambré à la température ambiante.



## EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale, peau sèche, démangeaison, peau qui pèle, picotement, rougeur, sensation de chaleur au site d'application, haleine d'ail, maux de tête, nausées, somnolence, étourdissements.

### Présentez-vous à l'urgence si vous notez :

- Une fièvre de 38,3 °C (101 °F) 1 fois ou de 38 °C (100,4 °F) 2 fois à 1 heure d'intervalle.



### Communiquer avec votre équipe traitante ou présentez-vous à l'urgence dans les plus brefs délais si vous notez :

- Une augmentation ou l'apparition de douleur ;
- Une augmentation ou l'apparition de rougeur ;
- L'apparition de démangeaison ;
- La présence d'une lésion cutanée (ampoule) ;
- La rupture de votre peau ;
- La présence d'un écoulement ;
- Une enflure ;
- Une odeur corporelle ;
- Une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.



### Remarque :

- Ne pas exposer la peau au soleil.
- Le DMSO peut endommager le plastique ou les tissus synthétiques.
- Pour usage externe seulement.

Professionnel de la santé

Numéro de téléphone