

Ces recommandations sont tirées du [Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques](#).



INDICATION

Le DMSO 99 % est l'antidote recommandé en présence d'une extravasation attribuable aux médicaments suivants :

- Mitomycine

En remplacement de la dexrazoxane s'il est impossible de l'administrer dans les 6 heures suivant l'extravasation :

- Daunorubicine
- Doxorubicine
- Épirubicine
- Idarubicine

Technique d'utilisation

- En usage topique seulement.
- Enlever le cathéter intraveineux avant de procéder à son application.
- Mettre des gants pour éviter l'irritation de la peau.
- Appliquer dans les 10 minutes suivant la détection de l'extravasation.
- Procéder à l'application topique du DMSO.
- Quantité : environ 4 gouttes par 10 cm². Il est important de couvrir le double de la surface atteinte (rougeur).
- Fréquence : aux 6 à 8 heures x 7 à 14 jours.
- Appliquer avec un compte-goutte en verre et étendre avec un applicateur à bout de coton et tige de bois (coton-tige) ou avec une compresse de coton (ne pas utiliser de tige en plastique).
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas couvrir le site d'un pansement).

Entreposage

Garder le DMSO 99 % à la température ambiante dans un contenant de verre.



EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale, sécheresse cutanée, démangeaison, peau qui pèle, picotement, rougeur, sensation de chaleur au site d'application, haleine d'ail (pouvant durer jusqu'à 72 heures après la fin du traitement), odeur corporelle, étourdissement, maux de tête, nausées, sédation.