

Ces recommandations sont tirées du [Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques](#).



INDICATION

La dexrazoxane vous a été prescrite pour diminuer les dommages possibles qui pourraient être attribuables à la chimiothérapie qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau.



EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements et diarrhée, fatigue, diminution de l'appétit, ulcères dans la bouche, douleur au point d'injection. Cependant, la plupart des effets semblent être associés à la chimiothérapie plutôt qu'à la dexrazoxane elle-même.

Présentez-vous à l'urgence si vous notez :

- Une fièvre de 38,3 °C (101 °F) 1 fois ou de 38 °C (100,4 °F) 2 fois à 1 heure d'intervalle.



Communiquer avec votre équipe traitante ou présentez-vous à l'urgence dans les plus brefs délais si vous notez :

- Une augmentation ou l'apparition de douleur;
- Une augmentation ou l'apparition de rougeur;
- L'apparition de démangeaison;
- La présence d'une lésion cutanée (ampoule);
- La rupture de votre peau;
- La présence d'un écoulement;
- Une enflure;
- Une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.

