

Ces recommandations sont tirées du [Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques](#).



## INDICATION

L'hyaluronidase est l'antidote recommandé en présence d'une extravasation causée par les alcaloïdes de la vinca. L'administration de l'hyaluronidase sous-cutanée est une procédure douloureuse. Assurez-vous que le patient reçoive un soulagement adéquat de la douleur avant de commencer cette procédure.

### Technique d'utilisation

- Faire 5 injections sous-cutanées de 0,1-0,2 ml en étoile autour du site de l'extravasation en changeant l'aiguille (25G ou moins) à chaque injection.
- Masser doucement la zone pour faciliter la dispersion du médicament.

### Entreposage

- Garder l'hyaluronidase à la température ambiante.
- La solution doit être utilisée immédiatement après sa préparation.
- Ne doit pas être administré si la poudre est décolorée (doit être de couleur blanche).



## EFFETS INDÉSIRABLES

- Œdème, irritation locale, infection, saignement, gonflement des yeux et présence d'ecchymoses.
- De rares cas de réaction allergique sévère ont été rapportés, commençant par une difficulté respiratoire, un rythme cardiaque accéléré et une transpiration abondante.



## CONTRE-INDICATIONS

- En présence d'une réaction sévère d'hypersensibilité à l'hyaluronidase.
- Ne pas utiliser d'hyaluronidase en injection intraveineuse.