

Ces recommandations sont tirées du [Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques](#).



INDICATION

L'hyaluronidase vous a été prescrite pour diminuer les dommages qui pourraient avoir été causés par la chimiothérapie qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau.



EFFETS INDÉSIRABLES

Enflure au site d'injection, réaction allergique (éruption cutanée, démangeaison, gonflement autour des yeux), irritation locale, infection, saignement et présence de bleus (ecchymoses).

Présentez-vous à l'urgence si vous notez :

- Un gonflement autour des yeux;
- Une fièvre de 38,3 °C (101 °F) 1 fois ou de 38 °C (100,4 °F) 2 fois à 1 heure d'intervalle.



Communiquer avec votre équipe traitante ou présentez-vous à l'urgence dans les plus brefs délais si vous notez :

- Une augmentation ou l'apparition de douleur;
- Une augmentation ou l'apparition de rougeur;
- L'apparition de démangeaison;
- La présence d'une lésion cutanée (ampoule);
- La rupture de votre peau;
- La présence d'un écoulement;
- Une enflure;
- Une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.



Professionnel de la santé

Numéro de téléphone

